

Задание №2 «Асимптотические разложения»

Задача 2.1 (*). Найти зависимость количества бозе-частиц $N(\mu) - N(0)$ от химического потенциала

$$N(\mu) = \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{\exp(\varepsilon + \mu) - 1}, \quad \mu \rightarrow +0.$$

Т.е. найти первый нетривиальный член разложения $N(\mu) - N(0) = \# \sqrt{\mu} + \mathcal{O}(\mu)$, $\mu \rightarrow +0$.

Замечание. Значение $N(0)$, которое вам не понадобится, выражается через ζ -функцию Римана. Соответствующая формула может быть найдена в [1, §58].

Задача 2.2 (*). Вычислить следующий интеграл с точностью до $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ при $\varepsilon \rightarrow +0$.

$$S(\varepsilon) = \int_0^{\sqrt{1-\varepsilon}} \sqrt{(1-x^2)^2 - \varepsilon^2}.$$

Т.е. найти числа в разложении $S(\varepsilon) = \#_1 + \#_2 \varepsilon^2 \ln(\#_3 \varepsilon) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$, $\varepsilon \rightarrow +0$.

Замечание. Указанный интеграл определяет расщепление энергетических уровней в симметричном двухъямном потенциале в квазиклассическом приближении. [2, §50]

Следующая задача призвана объяснить, зачем нужно оптимальное суммирование асимптотических рядов и когда уместно сохранять экспоненциально малые поправки.

Задача 2.3 (*). При помощи повторного интегрирования по частям постройте асимптотический ряд для интеграла

$$I(k) = \int_0^\pi \frac{\cos kx}{1+x^2} dx \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \sin \pi k}{k^{2n-1}} + \frac{b_n \cos \pi k}{k^{2n}}, \quad k \rightarrow +\infty.$$

Проделав те же операции после преобразования, покажите, что столь же законно написать

$$I(k) = \frac{\pi}{2} e^{-k} - \int_\pi^\infty \frac{\cos kx}{1+x^2} dx \sim \frac{\pi}{2} e^{-k} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \sin \pi k}{k^{2n-1}} + \frac{b_n \cos \pi k}{k^{2n}}, \quad k \rightarrow +\infty.$$

В каждом из двух случаев, оцените ошибку оптимально просуммированного ряда и ответьте, законно ли сохранять экспоненциально малую поправку в разложении $I(k)$.

Список литературы

- [1] Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц. *Теоретическая физика. Том 5. Статистическая физика. Часть 1.* ФИЗМАТЛИТ, Москва, 2013.
- [2] Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц. *Теоретическая физика. Том 3. Квантовая механика. Нерелятивистская теория.* ФИЗМАТЛИТ, Москва, 2008.